

# REUNIÓN A CAMPO SOBRE BÚFALOS

Asociación Argentina de Criadores de Búfalos. 1990. Veterinaria Argentina, 7(63):203-207.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Razas de búfalos](#)

## INTRODUCCIÓN

Después de 10 años de iniciarse la cría de búfalos como explotación racional en la Argentina, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos consideró necesario realizar una reunión a campo entre productores de búfalos y técnicos afines, para llevar a cabo una puesta a punto en común sobre todos los ítems que hacen a la producción bubalina en la Argentina: manejo, sanidad, comercialización, producción de carne, leche, cueros, etc.

Esta reunión se llevó a cabo el día 24 de Noviembre de 1989 en el establecimiento Santa Rosa de la firma EMEBE situado a 20 km al Norte de la ciudad de Esquina, Provincia de Corrientes.

El cronograma de la reunión se inició con una recorrida del campo por la mañana para ver los distintos rodeos bubalinos del establecimiento, donde se mostraron las tres razas que cría la empresa, y las distintas categorías de animales en engorde; a continuación se trataron los temas técnicos, preparados por el Dr. H. Calace Gallo sobre aspectos reproductivos y sanitarios y por el Sr. J. Bencich sobre perspectivas y posibilidades de la explotación de cueros de búfalos. Por la tarde, se organizaron grupos de trabajo entre los asistentes, que con un coordinador trabajaron sobre un cuestionario básico propuesto; sus conclusiones fueron resumidas y se exponen a continuación:

## TEMA: MANEJO

### A. SERVICIO

Aunque la práctica corriente entre los productores es el servicio continuo, se estimó que sería conveniente estacionarlo, especialmente con el objetivo de evitar acostumbramiento de los toros a sus rodeos, lo que trae problemas de peleas entre los mismos con consecuencias frecuentemente serias. El servicio debería darse entre mediados del verano y fines del otoño (enero a junio o julio) con temperaturas en disminución y fotoperíodo en acorte.

En general existen problemas de carácter de los toros en servicio, que no toleran el agregado de otro padre a su rodeo; este comportamiento se agrava con la edad, de manera que se estima que haciéndolos convivir juntos en la época interservicios, agregando los toros juntos a los rodeos y eliminando los de más edad (más de 5 o 6 años) y los que presenten problemas visibles de carácter, debería mejorar sensiblemente esta dificultad característica en el manejo de los padres.

En cuanto al porcentaje de toros se estimó que para un servicio individual bastaría con un 2 %, para un planteo semiextensivo el 3 % y para grandes extensiones con rodeos numerosos sería necesario elevar dicho porcentaje al 5 %.

### B. DESTETE

En este tema los concurrentes adoptan dos posturas; algunos hacen un destete de 10 meses de edad, argumentando que este manejo no afecta la preñez del rodeo. Otros hacen un destete más temprano, de 7 a 8 meses, ya que a partir del 6º mes de lactancia la producción de leche de la madre decae abruptamente y permitiría a la madre recuperar peso antes del nuevo parto.

### C. CASTRACIÓN

Todos los productores consideran necesario castrar a partir de que en la faena se tipifican como toros a los animales enteros, depreciando su valor, lo que no sucede en otros países. Sobre el momento de hacerlo hay diversas opiniones; debería ser motivo de un estudio al respecto.

### D. DESCORNE

Esta práctica no se lleva a cabo entre los productores argentinos, aunque se considera de utilidad hacerlo ya que es bastante corriente en el Brasil. El animal sin cuernos pierde carácter, hay menos accidentes en acarreo, racionamiento, etc. Presenta el problema que dado su característica debe hacerse dentro de la semana de vida si no vuelven a crecer. En el caso de producción de reproductores, el cuerno es una característica racial que no debe estar ausente.

## **E. EDAD DE ENTORE**

Debe ser de 24 meses tanto para el macho como para la hembra.

## **F. DESCARTES**

Los descartes de vientres de los rodeos en el país aún son mínimos, ya que la prioridad es el aumento del número de animales. Es así que sólo se descartan hembras que sean infértiles. En un futuro será necesario tener en cuenta en los descartes los problemas de subfertilidad que puedan presentarse.

## **G. SANIDAD**

**1°.- Ternero:** Presenta problemas de coccidiosis en los primeros días de vida, lo que hace necesario una aplicación bien temprana de sulfamidas (7 a 15 días de edad) junto con un desparasitante de amplio espectro. Repetir el desparasitante al destete. Brucelosis: vacunar las terneras entre 4 y 8 meses de edad. Vacunar contra aftosa igual que los vacunos. Es importante que entren al invierno tratados contra piojos, a los que son especialmente sensibles (baños de inmersión, productos "spot on", etc.).

**2°.- Recría:** La frecuencia de desparasitaciones internas propuestas fue variable, pero se aconseja no menos que un tratamiento cada 90 días. Vacunaciones de aftosa y carbunco similares al vacuno. Tratamiento otoñal contra piojos. En zonas de saguaypé, hacer tratamientos a inicio de primavera.

**3°.- Adulto:** Vacunaciones como el vacuno más el tratamiento contra piojos.

## **H. FRECUENCIA DE TRABAJO**

Se consideró importante la respuesta del búfalo al trabajo bien hecho, por lo que una buena norma de manejo es pasarlos por la manga con la mayor frecuencia posible sin maltratarlos para que se acostumbren.

## **I. RAZAS**

Aunque se manejan conocimientos raciales de datos internacionales, en el país la mayoría de los productores trabaja con el tipo de animal que ha podido adquirir. Como datos generales las razas de mayor tamaño tienen requerimientos alimenticios superiores (Jaffarabadi) a las más pequeñas (Mediterránea). En cuanto a la aptitud lechera es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora, notándose sí la dificultad de amansar búfalas adultas para ordeño.

## **F. ENGORDE**

Los búfalos en engorde, en casi todos los casos en campo natural, alcanzan un peso de faena de 500 kg a los 26 a 27 meses de edad o de 630 kg a los 3 años. Si fuera posible darle alguna pastura o suplemento en el segundo invierno, pueden faenarse con 440 kg a los 20 meses que coincide con un momento de precios normales más favorable para la carne.

## **TEMA: DIFICULTADES QUE PRESENTA LA EXPLOTACIÓN DE BÚFALOS EN EL PAÍS**

Los presentes estuvieron de acuerdo en que la principal dificultad es la adquisición de vientres. Conseguirlos en el país es muy difícil por la escasez extrema de la oferta; de manera que por ahora la solución posible pasa por la importación. Es pues necesario seguir trabajando para lograr bajar las barreras que todavía la traban. Es este un emprendimiento que con el aporte de todos debería hacerse vía Asociación; se pidió mantener informados a los productores de todas las novedades que pudieran sucederse en este sentido.

En cuanto a la comercialización de los animales para faena, presenta algunas dificultades de colocación, aunque los frigoríficos parecen poder colocar la carne sin problemas. Un avance en este sentido será enviar los machos castrados a faena, a edad temprana. Puede ayudar también el descorne.

Debería seguirse con la difusión de la carne de búfalo entre frigoríficos y abastecedores. Es importante hacer ventas en conjunto para tener mayor volumen y poder de negociación.

## **INFORME SOBRE CUEROS**

Este informe fue recopilado y presentado por el Sr. J. Bencich, en base a trabajos realizados en el país. Este año se curtieron 30 cueros, después de sortear numerosas dificultades con frigoríficos y curtiembres. Todo hace pensar que quizás el búfalo valga más por su cuero que por su carne. Sin embargo los problemas que por ahora se presentan para lograr el producto final requerido son numerosos.

Entre las características principales que lo diferencian del cuero vacuno están: el peso, el cuero bubalino pesa el doble que el vacuno; a la tracción su resistencia es superior. Es notablemente más espeso lo que hace necesario hacer 3 cortes en la curtiembre, en vez de los 2 del vacuno, produciendo 1 flor y 2 descarnes. Tiene entre 3, 5 y 4 metros de flor. Se habla entre 25 dólares el metro de flor curtida de vacuno contra 50 dólares del de búfalo en el mercado internacional.

Por cada bulbo capilar presenta 3 glándulas sudoríparas, el vacuno una (INTI de La Plata).

La primera experiencia, en 1988 se hizo en una curtiembre artesanal y no a nivel de una gran calidad. En la segunda oportunidad se trabajó con técnicas muy elaboradas (este trabajo lo llevó a cabo el Sr. F. Cabezas). Presentado el producto final logrado a un experto en zapatos, logró una óptima opinión. El destino final de este producto sería la exportación; el mercado europeo y el italiano en particular es muy ávido de cueros exóticos. Un pequeño ejemplo de esto es que el automóvil Porsche en una opción especial, tapizado con cuero de búfalo, vale u\$s 2.500 más.

Es también necesario tener en cuenta que aunque la materia prima es valiosa, es muy importante el valor agregado por las curtiembres para lograr el producto final deseado por el mercado demandante.

Volver a: [Razas de búfalos](#)