

PRODUCCIÓN DE MULATO II EN COLONIA BENÍTEZ

Ing. M Sc Juan José Verdoljak; Ing. MSc. Federico Miranda; Ing. M Sc Carlos Roig; Téc. Esp. Roberto Fernández. 2010.
INTA Proyecto Regional Ganados y Carnes, Centro Regional Chaco-Formosa.
jjverdoljak@correo.inta.gov.ar
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Megatérmicas](#)

El Mulato II es el resultado de tres generaciones de cruzamientos y selección de la gramínea *Brachiaria*. Es un híbrido de crecimiento semierecto que puede alcanzar hasta 1 m de altura., tallos cilíndricos. Hojas de 3.8 cm de ancho y color verde intenso, presentando abundante pilosidad en ambos lados de la lámina.



Esta gramínea crece bien en condiciones sub húmedas con 5 a 6 meses secos y precipitaciones anuales mayores de 700 mm. Es de fácil establecimiento por semillas, con densidades de siembra de hasta 6 kg por ha. Debido a que su crecimiento es vigoroso, en algunos casos se puede aprovechar la pastura a los 4 meses de la siembra.

Su utilización es básicamente en pastoreo directo, pero ofrece como alternativa la fabricación de rollos o fardos.


En la EEA Colonia Benítez, se evaluó la producción mensual y el valor nutritivo del Mulato II, el mismo fue sembrado el 05 de febrero de 2008, sobre un suelo franco arenoso. Los cortes evaluativos se comenzaron en la primavera siguiente (2009), para tal efecto se realizaron cortes mensuales.



PRODUCCIÓN MENSUAL

En la figura 1 se observa los kg de materia seca (MS) producidos por mes, la cual tuvo un pico de producción en noviembre, el mismo coincide con la mayor precipitación registrada en el período de evaluación.

Figura 1.- producción mensual de kg MS ha⁻¹ de Mulato II.



VALOR NUTRICIONAL

Se obtuvieron datos de valor nutricional en algunos cortes de Mulato II (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Valor nutricional de cortes mensuales de Mulato II.

Fechas de muestreo	% Proteína	% FDN	% FDA
21/11/2009	7,44	64,5	34,7
21/12/2009	6,13	69	37
21/01/2010	8,14	64,46	34,4

Fuente: Laboratorio EEA Reconquista

FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida.

Debido a que los datos presentados son preliminares, es necesario continuar con las evaluaciones de producción, calidad, palatabilidad y producción secundaria.

Sin embargo las características evidenciadas hasta el momento hacen factible la inclusión de Mulato II al sistema ganadero del NEA.

Volver a: [Megatérmicas](#)