

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE GRAMINEAS CAMPO NATURAL DE LA REGIÓN CHAQUEÑA

C. Kunst, M. Cornacchione, S. Bravo. 1998. GTProducción animal, EEA INTA Santiago del Estero.
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Pasturas naturales: especies](#)

GRAMÍNEAS DE PASTIZALES NATURALES DE LA REGIÓN CHAQUEÑA

	Bosques y arbustales (media sombra)							Sabanas y parques (luz plena)				
	Setaria leianta	Trichloris crinita	Digitaria californica	Trichloris plutriflora	Couinia latifolia	Gouinia paraguariensis	Chloris ciliata	Elionorus muticus	Pappophorum pappipherum	Schyzachirium tenerum	Heteropogon sp.	Botrichloa laguroides
Nombre común	Cola de zorro	Pasto crespo	Pasto plateado	Pasto Crespo grande	Sorguillo	Sorguillo	Pata de gallo	Aibe	Pasto criollo	Pasto colorado escoba dura	Pasto colorado	Nombre común
Clasificación ecológica productiva (1)	D	D	D	D	IN	IN	IN	I-IN	IN	D	D	D - IN
Sitio	alto	alto	alto	alto-media loma	alto	alto	media loma	bajo	media loma - bajo	bajo	bajo	bajo
Condición del pastizal (2)	B - R	B	B	B - R	B	B	E - B	B	R	E	E	B - R
Oferta de forraje (3)	2000	2000-3000	2000-3000	4000-5000	2000	2000	1000	5000-6000	4000-6000	3000-4000	3000	2000-3000
Preferencia animal	Media a alta	Media a alta	Alta a muy alta	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Baja a Media	Baja a Media	Baja a Media	Baja a Media	Baja a Media	Baja a Media
Contenido proteína bruta (4)	13%	10%	10%	10%	11%	8%	7-8%	5-8%				
Tolerancia al fuego	media a baja	media a baja	media a baja	alta	alta	baja		alta	alta	alta	alta	alta

Todas las especies poseen ciclo estival

Referencias:

- Condición del pastizal. E=Excelente, B=Buena, R=Regular
- Clasificación: D=Deseable, I=Indeseable, IN=Intermedia
- En Kg materia seca/ha. como cultivo puro
- Se expresa en porcentaje de materia seca en el estado fenológico vegetativo de las plantas

<p>El campo natural no es uniforme. Existen distintos "sitios de pastizal", con diferente producción de forraje que se encuentra en distintas condiciones de pastizal. Esta realidad impone distintas formas de uso del pastizal que están determinadas por:</p>	==>	¿Cómo aplicar la carga?	==>	A través del sistema de pastoreo, que permite un uso más adecuado del recurso
	==>	¿Cuánta carga animal pueden soportar los distintos sitios del pastizal?	==>	El campo natural es dinámico, cambia a lo largo del año y entre años. Se debe estimar la "receptividad de los potreros".

Volver a: [Pasturas naturales: especies](#)