

CALENDARIO SANITARIO BOVINO REGIONAL

NorSaFe
PROGRAMA EXTENSIÓN GANADERA
SOC. RURAL RECONQUISTA
EEA INTA RECONQUISTA

Práctica	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Categoría	Signos	Consideraciones
Aftosa 1													Vacunar TODO el rodeo	Fiebre, debilidad o flojera. Falta de apetito. Aftas en boca y pesuñas. Babeo. Rengueras.	Es OBLIGATORIA . A cargo del VETERINARIO CORRESPONSABLE SANITARIO. Las fechas de vacunación se establecen desde SENASA y localmente en las UEL.
Brucelosis (vacunación) 2													Vacunar a: Terneros entre 3 y 8 meses de edad.	Abortos tardíos (más de 7 meses). Retención de placentas. Terneros nacidos débiles.	Es OBLIGATORIA y se realiza junto con aftosa y se debe asentar en el SENASA. AFECTA AL HOMBRE.
Mancha													Vacunar a: Terneros de 3-4 meses. Repetir al destete	Ataca a terneros y novillitos de 4 a 18 meses. Con hinchazón en las grandes masas musculares. En general mueren.	Vienen juntas en el mismo frasco. En los lotes Cabeza y cuerpo de parición: vacunar a los 3 meses de edad y repetir al destete. En lote cola: noviembre. En la recría repetir al año de edad.
Gangrena Gaseosa														Por heridas accidentales donde entra la infección. Fiebre, temblores, muerte.	
Enterotoxemia														Diarrea, dolor abdominal, convulsiones y muerte.	
Carbunclo Bacteriano													Vacunar a: Todo el Rodeo mayor a 1 año	Muerte rápida. La sangre no coagula y sale por los orificios naturales (nariz, por ejemplo) rigidez cadavérica. Aparece más en verano.	Una sola vez al año. AFECTA AL HOMBRE. Nunca tocar ni mover un animal sospechoso. Llamar rápidamente al Veterinario y luego del diagnóstico. Cavar una fosa y enterrar. "NUNCA QUEMAR".
Septicemia Hemorrágica													Vacunar a: Todo el Rodeo	Fiebre, tos, secreciones nasales, lagrimeo. Muerte rápida.	Ocurre cuando bajan las defensas. Vacunar: • 15 días antes de arrear lotes, • en periodos de inundación y • en sequías. No juntar muchos trabajos o movimientos.
Querato conjuntivitis													Vacunar a: TODO el rodeo	Lagrimeo, descarga ocular, conjuntivitis, úlcera corneal y ceguera.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días). Es muy contagiosa y asociada a IBR es de difícil erradicación. Usar vacunas combinadas con Moraxella Bovis e IBR.
I.B.R. (Rinotraqueitis Infecciosa Bovina)													Vacunar a: Vaquillonas 1° servicio Toros (antes del servicio)	Congestión respiratoria, secreciones nasales y oculares en terneros. Inflamación de vulva y vagina. Llagas en el prepucio de toros. ABORTOS TEMPRANOS.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días). MUY CONTAGIOSA.
D.V.B 4 (Diarrea Viral Bovina)													Vacas Destete Precoz y engorde a corral	Terneros nacidos débiles y con malformaciones. Vesículas y llagas en la mucosa bucal de los terneros. Fiebre. Hemorragia del tubo digestivo. Abortos tempranos y tardíos.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días).
Vibriosis genital Bovina 5 (campylobacteriosis)													Vacunar a: Vaquillonas y Toros6	Repetición de celos 5 a 6 veces hasta lograr la preñez. Abortos.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días). Se transmite por los toros en el servicio.
Leptospirosis													Vacunar a: Vaquillonas y vacas.	Abortos, decaimiento, fiebre, orina de color oscuro. Ictericia.	Vacunar 30 y 60 días pre servicio. AFECTA AL HOMBRE.
Diarrea Neonatal													Vacunar a: Vientres 7° mes de gestación	Diarrea blanca, decaimiento, deshidratación.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días).
Neumoenteritis													Vacunar a: Vientres 7° mes de gestación	Diarreas, neumonías, fiebre.	Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días). Terneros antes de los 15 días de vida si no se vacunó la madre.
Botulismo													Vacunar a: Mayores a 1 año		Primera vacunación: 2 dosis (intervalo de 30 días). AFECTA AL HOMBRE.
Rabia Paresiente													Vacunar a: Todo el rodeo	Animales "sentados" con paresia en el tren posterior.	1 vez al año. AFECTA AL HOMBRE.
Gastroenteritis verminosa (causada por parásitos del aparato digestivo) PrevioHPG													Terneros al pie Destete	Colas sucias, debilidad, pelo feo, falta de estado corporal.	30 a 40 días antes del destete. INYECTABLE. 2 DOSIS separadas 40 días. Inyectable/oral.
													Vaquill. reposición		2 DOSIS separadas 40 días. Inyectable/oral.
													Novillitos recría	Colas sucias, debilidad, pelo feo, falta de estado corporal.	2 DOSIS separadas 40 días. Inyectable/oral.
													Vaquillonas 1° servicio		2 DOSIS antes del servicio , separadas 30 a 40 días. Inyectable / oral / intrarruminal.
													Novillos	Cascarrias, falta de estado (aun con buen pasto)	Oral / intrarruminal.
													Vacas de cría		A aquellas en mal estado. Oral / intrarruminal.
													Toros		Al salir y entrar a servicio. Oral / intrarruminal.
Complejos Vitamínicos y Minerales													Suplementar a: Terneros - Destete Recría Vacas y Toros	Estados carenciales - falta de condición corporal. Defensas bajas	Aplicar a la entrada del invierno, en sequías prolongadas o inundaciones. Junto con desparasitaciones.
COBRE														Pelaje arratonado, anteojeras, falta de estado corporal, poca ganancia de peso.	Aplicar en lo posible 3 veces al año.
Calcio													Terneros - Destete Vacas con cría Vacas caídas		Invierno con falta de pasto: combinado con otros minerales. En Vacas caídas: aplicar lentamente en vena del cuello.

Este Plan Técnico Sanitario ha sido elaborado para ORIENTAR al Productor Ganadero.

Ante cualquier duda consulte a su Veterinario Asesor

1 y 2: Enfermedades en PLANES NACIONALES de erradicación. Manténgase informado.

COLORES: **VERDE** VACUNAS que DEBEN realizarse sin excepción - **ROSA** VACUNAS OPTATIVAS según la realidad del campo - **NARANJA** ANTIPARASITARIOS, categorías ubicadas en orden de importancia - **VERDE Y****CELESTE** suplementos minerales.

3 y 4: Enfermedades Reproductivas con marcado perjuicio en la región. Vacunar en rodeos con servicio estacionado. Realizar Sanidad al rodeo previamente.

5 En casos excepcionales. SÓLO SE RECOMIENDA cuando el número de toros enfermos es TAN elevado que resulta imposible cambiarlos a todos en un solo año

