

Alerta neumonía

La enfermedad respiratoria bovina es un síndrome que afecta generalmente a animales de menos de 2 años de edad y es producido por diferentes agentes infecciosos, y predispuesto por varios factores.



Las maniobras más estresantes en la vida de los bovinos son el destete y el transporte.

Según Germán Cantón de INTA Balcarce, en algunos episodios muy severos se han visto afectados hasta el 9,5% de los terneros al pie de la madre, provocando una **mortandad que no supera el 1,6% cuando la enfermedad se diagnostica a tiempo y se trata apropiadamente.**

En cambio, cuando los sistemas ganaderos se intensifican, esta problemática pasa a ser más prevalente. Y sin dudas, el principal sistema ganadero afectado es la recría y engorde a corral, representando las neumonías casi la mitad de todos los problemas sanitarios que afectan a esos rodeos.

“La enfermedad respiratoria es compleja y multifactorial, ya que involucra factores relacionados al animal (estrés) e infecciones virales que afectan sus defensas naturales, favoreciendo luego las infecciones bacterianas. Además, factores climático-ambientales pueden también empeorar estos cuadros. Por esta razón, es de difícil control y prevención”, destacó Cantón.

MOMENTOS CLAVE

Es fundamental tener en cuenta el manejo de los animales. El principal factor a considerar es el estrés, **siendo las maniobras más estresantes en la vida de los bovinos el destete y transporte.** Los terneros de destete precoz son una de las categorías más susceptibles a esta enfermedad, con la aparición de cuadros severos de neumonías si no se realiza apropiadamente.

PREVENCIÓN

Aparte de lograr una reducción en los factores estresantes y de manejo, el profesional de INTA Balcarce sostiene que es importante incorporar vacunas contra estos agentes. Esto no permitirá erradicar la enfermedad respiratoria, sino que generará una inmunidad poblacional que logrará reducir las implicancias que estas patologías tienen, sobre todo en sistemas de engorde intensivos.

Se recomienda su aplicación en los terneros predestete, antes de este factor estresante, para generar una inmunidad apropiada con tiempo. En el caso de terneros de destete precoz, se recomienda la aplicación de 2 dosis predestete y una tercera revacunación a los 6 meses. En el caso de un destete tradicional (6 a 8 meses de edad), si se realiza recría propia, de la misma manera se recomienda la aplicación de 2 dosis de vacuna predestete.

*Servicio de Diagnóstico
Veterinario Especializado
INTA Balcarce*