


## A TENER EN CUENTA...

- Los bebederos deben tener siempre agua fresca y potable.
- Mantener los comederos constantemente con alimento (etapa de cría y recría).
- Mantener las camas secas. Mantener alejados perros, gatos y otros animales carnívoros del gallinero. No tener aves de distintas edades en el mismo gallinero.
- Controlar la ventilación y temperatura del ambiente.



Distribución de las aves según Temperatura

- La calefacción puede suministrarse con un foco convencional acomodando su altura para regular la temperatura.
- La luz artificial es importante durante las 3 primeras semanas de vida como fuente de calor y estímulo de consumo de alimento. Luego es necesario bajar las hs. de luz para no perjudicar la madurez sexual.
- Retirar y eliminar inmediatamente las aves muertas.
- Como niales se pueden usar cajones de fruta con paja, ubicándolos al menos a 45 cm de altura. Se coloca 1 cada 4 gallinas.
- Recolectar los huevos 2 veces al día para evitar que se rompan o encluequen.

## ALIMENTACIÓN

**Etapa de Cría**  
(del nacimiento a los 45 días)  
Alimento balanceado, tipo cría o iniciador, con el 20% de proteínas.

¿Cuánto? A voluntad.

**Consumo esperado:**  
2kg por ave durante todo el período.



### Etapa de Recría

(de los 45 días a los 5 meses)  
Alimento balanceado, tipo recría, con el 17 % de proteínas.

¿Cuánto? A voluntad.

### Consumo esperado:

7kg por ave durante todo el período.

### Postura

(a partir de los 5 meses)  
Alimento balanceado, tipo postura, con no menos del 15 % de proteína.

¿Cuánto? Controlar la cantidad de alimento, dar: 120 g de alimento por ave por día.

**Otra opción:** 100g de alimento balanceado más 30 g de maíz partido.

**EL CONSUMO DE AGUA ES EL DOBLE DEL CONSUMO DE ALIMENTO**

## COMEDEROS Y BEBEDEROS

Los más comunes para aves adultas son los de tipo tolva.  
Están conformados por 2 partes: el plato y el depósito.



El plato de la tolva debe ubicarse a la altura del lomo del animal.

Comederos



Bebederos

## DATOS INTERESANTES

La postura de huevos comienza a partir de los 6 meses, aunque en algunos casos puede adelantarse.

Las gallinas ponen sus huevos cuando los días tienen más de 14 horas de luz. Por eso en otoño-invierno es necesario complementar con luz artificial hasta alcanzar 14 hs continuas.

El color de la cáscara del huevo está determinado genéticamente, nada tiene que ver la alimentación. El alimento si puede influir sobre el color de la yema.

**BUEN HABITO:** los huevos se deben lavar antes de cascarlos para cocinar; al recolectarlos solo se cepillan para quitar la suciedad.

### Contactos referentes: INTA - Pro Huerta

**EEA Alto Valle:**  
**AER Villa Regina** 029484461127  
**E-mail:** fernandez.edgardo@inta.gob.ar


**EEA Bariloche:** 02944422731  
**E-mail:** subiabre.marcos@inta.gob.ar

**EEA Valle Inferior:** 02920423474  
**E-mail:** stiglauer.marcela@inta.gob.ar

**Autora:** Med.Vet. Mariana Dacal Arriaga-AER Conesa, EEA Valle Inferior.  
**E-mail:** dacal.mariana@inta.gob.ar



## CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS



La cria de traspatio de gallinas ponedoras es implementada por el Programa Pro Huerta, como alternativa a la producción familiar, contribuyendo a una alimentación variada y complementando el aporte proteico a la dieta mediante la producción y consumo de huevos.



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación