

# DISTRIBUCIÓN EN EL MUNDO

Lic. Wálter S. Prado\*. 2001. [www.yacare.net](http://www.yacare.net) [walterprado@yacare.net](mailto:walterprado@yacare.net)

\*Lic. en Ciencias Biológicas; miembro de Crocodile Specialist Group-Species Survival Commission-UICN,  
Proyecto de Conservación y Uso Sustentable de Yacarés Overos y Negros en la Provincia del Chaco;  
Director Técnico del Refugio de Vida Silvestre El Cachapé, Provincia del Chaco, Argentina.  
[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Producción de Yacarés](#)


## DISTRIBUCIÓN EN SUDAMÉRICA

El yacaré overo (*Caiman latirostris*) habita los humedales de Sudamérica.

Su área de distribución comprende el noreste de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.




El yacaré negro (*Caiman yacare*) es un crocodílido sudamericano. Comparte un amplio sector de su área de distribución con la de *Caiman latirostris*. Habita los humedales del sur y del este de Bolivia, noreste de Argentina, sur y centro-oeste de Brasil, y Paraguay.



## DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA

En Argentina, *Caiman latirostris* habita una diversa gama de ambientes acuáticos de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Jujuy.



El área de distribución de *Caiman yacare*, lo sitúa en los ambientes acuáticos de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe.



Volver a: [Producción de Yacarés](#)