

FASCIOLA HEPÁTICA: SAGUAYPÉ

MV Bibiana Cetrá. 2008. Grupo Sanidad Animal, INTA EEA Mercedes, Corrientes.
bcetra@correo.inta.gov.ar
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Enf. parasitarias en general y de bovinos](#)




La fasciolosis es una enfermedad parasitaria que afecta a animales y ocasionalmente al hombre. Es causada por el trematode *Fasciola hepatica*.

Ciclo Biológico

El ciclo biológico de la *Fasciola hepatica* se realiza en dos huéspedes, uno intermediano (caracol) y otro definitivo (mamífero). En ambos la población del parásito aumenta en gran escala. El ciclo completo dura alrededor de 8 meses, dependiendo de las condiciones climáticas.

La *Fasciola* adulta vive en los canalículos biliares del hígado del huésped definitivo. Cada una de ellas elimina por día alrededor de 20.000 huevos.



Control

Las recomendaciones de control de esta parasitosis, varían entre establecimientos y hasta entre potreros, según topografía y manejo de la hacienda.

Las medidas de control de *Fasciola hepatica* se centran en 3 puntos:

- 1- Control del parásito en los rumiantes (el más práctico para realizar)
- 2- Control en los estadios libres
- 3- Control de los caracoles intermedios.

El uso de antihelmínticos tiene como objetivo eliminar el agente causal de la enfermedad e interrumpir la excreción de huevos por materia fecal, así prevenir que se contamine la pastura y los caracoles. Se recomienda poner en

práctica un plan estratégico de control, con un mínimo de dosificaciones anuales, para evitar la aparición de resistencia del parásito a las drogas.

Teniendo en cuenta la epidemiología en la región, el clima y el manejo, una estrategia de desparasitación podría ser:

-Fin de invierno o principio de primavera.
Se eliminarán los parásitos instala-

dos en otoño y se reducirá la contaminación de pasturas.

-Verano. Para la eliminación de los parásitos ingeridos en primavera – verano.

-Fin de otoño. Se eliminarán los parásitos ingeridos en verano y principio de otoño.

Siempre con controles de huevos en

Distribución de la Fasciola hepática en Corrientes



[Volver a: Enf. parasitarias en general y de bovinos](#)